Ein Service des Deutschen Hausärzteverbandes

©AdobeStock – simoneminth

Impfkalender (Standardimpfungen) für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene

IMPFUNG	ALTER IN WOCHEN	ALTER IN MONATEN					ALTER IN JAHREN						
	6	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	9-14	15-16	17	AB 18	AB 60
Tetanus		G1	G2	G3	G4	N	N	A1	A2		N	A (ggf. N) [e]	
Diphterie		G1	G2	G3	G4	N	N	A1	A2		N	A (ggf. N) [e]	
Pertussis		G1	G2	G3	G4	N	N	A1	A2		N	A (ggf. N) [e]	
Hib *H. influenzae Typ b*		G1	G2 [c]	G3	G4	N	N						
Poliomyelitis		G1	G2 [c]	G3	G4	N	N		A1		N	ggf. N	
Hepatitis B		G1	G2 [c]	G3	G4	N	N						
Pneumokokken [a]		G1		G2	G3	N							S [g]
Rotaviren	G1 [b]	G2	G3										
Meningokokken C					G1 (ab 12 Mo.)		N						
Masern					G1	G2	N					S [f]	
Mumps, Röteln					G1	G2	N						
Varizellen					G1	G2	N						
Influenza													S (jährl.)
HPV *Humane Papillomviren*									G1 [d]	G2 [d]	N [d]		

NEU: Standardimpfung gegen Herpes zoster mit Totimpfstoff empfohlen für Personen ab 60 Jahren; weitere Informationen hier: *(Epid. Bull. 50/2018)*

Erläuterungen

G Grundimmunisierung (in bis zu 4 Teilimpfungen G1 – G4)

A Auffrischimpfung

S Standardimpfung

N Nachholimpfung
(Grund- bzw. Erstimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)

a Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen.

b Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.

c Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen.

d Standardimpfung für Mädchen und Jungen im Alter von 9 – 14 Jahren mit 2 Impfstoffdosen im Abstand von mindestens 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter > 14 Jahren oder bei einem Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich (Fachinformation beachten).

e Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.

f Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit.

g Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff.

Quelle: Robert Koch-Institut, Epidemiologisches Bulletin Nr. 34, 23. August 2018

Mühlenfeld, Richter-Scheer; Stand 5/2019

GEPRÜFTE FORTBILDUNG IHF FÜR DEN HAUSARZT GEEIGNET

DEUTSCHER HAUSÄRZTEVERBAND